

Детская аптечка

- При формировании детской аптечки в первую очередь пользуйтесь рекомендациями педиатра.
- Отбирайте в аптечку медикаменты только с действующим сроком годности, в заводской упаковке и с прилагаемой инструкцией. При хранении лекарств соблюдайте температурный режим.
- Аптечка должна находиться в недоступном для детей месте.

Недомогание	Рекомендуемые препараты
Опрелости	Мирамистин® в упаковке 150 мл.
Режутся зубки	Дентинокс гель, бибидент
Газообразование, боли в животе	Симетикон (эспумизан), фенхеля плоды (плантекс)
Диарея	Энтеросгель (полиметилсилоксана полигидрат), нифуроксазид (эрсефурил) для детей старше 1 мес.
Отравление	Энтеросгель (полиметилсилоксана полигидрат), активированный уголь
Повышенная температура	Сироп панадол, свечи эффералган
Простудные заболевания	Мирамистин® в упаковке 150 мл., витамин С, парацетамол
Аллергия	Диметинден (фенистил) детям от 1 мес. до 1 года по строгим показаниям, левоцетиризин (ксизал) для детей старше 6 лет
Укусы насекомых	Мирамистин® в упаковке 150 мл.
Ожоги солнечные и термические	Мирамистин® в упаковке 150 мл., спасатель крем
Мелкие ссадины и порезы	Мирамистин® в упаковке 150 мл.
Для новорождённого	Стерильные вата, бинт, ватные палочки, пипетка, Мирамистин® в упаковке 150 мл. с насадкой-распылителем, раствор перманганата калия, семена укропа, фенхеля, сборы череды и ромашки, несколько клизм по 25 мл., электронные термометры для измерения температуры тела и воды в ванночке, резиновый жгут

Указанный перечень препаратов носит информационный характер. В качестве рекомендуемых препаратов указаны международные непатентованные названия. Самолечение опасно для здоровья, при возникновении первых признаков заболевания рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту.

Пусть Ваши дети будут здоровы!
Всегда Ваш, Мирамистин®